

Cardiopatías congénitas del adulto

Experiencia quirúrgica año 2007

Población

- ❑ 10 pacientes
 - ❑ Edad media 36 años (26-66)
 - ❑ Operación previa 8 pacientes
 - ❑ Patología congénita
 - Comunicación interauricular 2
 - Comunicación interventricular 2
 - Anomalía de Ebstein 2
 - Estenosis pulmonar 1
 - Atresia tricúspide 1
 - Ductus y membrana subaórtica 1
 - Coartación aórtica 1
-

Técnicas en CIA (2 pacientes)

- ❑ Cierre de CIA cava inferior residual y anuloplastia tricúspide
 - ❑ Cierre de CIA ostium Primum y cierre de cleft mitral
-

Técnica en CIV (2 pacientes)

- Cierre de CIV residual, sustitución valvular aórtica y plastia tricúspide

 - Cierre de CIV infundibular y sustitución valvular aórtica
-

Técnica en anomalía de Ebstein (2 pacientes)

- ❑ Recambio de prótesis tricúspide y colocación de marcapasos epicárdico bicameral

 - ❑ Colocación de prótesis tricúspide.
(Colocación posterior de marcapasos epicárdico por bloqueo A-V en el postoperatorio)
-

Técnica en estenosis pulmonar

- Prótesis pulmonar

Técnica en atresia tricúspide con vasos en transposición

- Ampliación de CIV, resección de estenosis subpulmonar y colocación de marcapasos epicárdico
-

Técnica en Ductus

- Cierre de ductus, resección de membrana subaórtica y recambio valvular aórtico por endocarditis originada en el ductus

Técnica en coartación de aorta

- Resección de aneurisma en aorta torácica en paciente intervenido previamente de coartación de aorta
-

Evolución postoperatoria

- Mortalidad 0

 - Complicaciones
 - Marcapasos definitivo 1 paciente
 - Bajo gasto 1 paciente
 - ACVA transitorio 1 paciente
-

Evolución postoperatoria

- Tiempo medio ventilación mecánica 12 horas
 - Estancia media en UVI 2 días
 - Estancia postoperatoria 15 días (7-56)
-