



**INFORMACIÓN PARA PACIENTES
Y
FAMILIARES**

PROFILAXIS DE LA ENDOCARDITIS

Dr. J. M. Cortina Romero

Dr. E. Pérez de la Sota

Dr. A. Forteza Gil

Dra. M^a. J. López Gude

Dr. J. E. Centeno Rodríguez

**SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIACA
HOSPITAL "12 DE OCTUBRE"**

PROFILAXIS DE LA ENDOCARDITIS*¥

Los procesos infecciosos de cualquier tipo (cutáneos, respiratorios, de vías urinarias, etc) que padezca, deberán ser tratados precoz y enérgicamente con los antibióticos adecuados.

En caso de intervenciones EN LOS DIENTES, BOCA, OIDOS, NARIZ, GARGANTA O EXPLORACIONES ESOFAGICAS para prevenir la ENDOCARDITIS BACTERIANA, precisa antibióticos ya que en el interior de la orofaringe existen normalmente gérmenes (bacterias), que durante la extracción o exploración pueden entrar en contacto con la sangre e ir a alojarse en el corazón, produciendo una infección (Endocarditis Bacteriana). Para prevenir que esto ocurra deberá tomar una hora antes de la intervención (como dosis única):

	Amoxicilina 2 gramos. (Clamoxyl x 1 gramo, tomar 2 comprimidos)
<i>Si es alérgico a la penicilina:</i>	Clindamicina (Dalacin 600 mg) (Dalacin 300 mg 2 comprimidos)
<u><i>Si no puede tomar medicación:</i></u>	Ampicilina 2 gramos intramuscular o intravenosa, dentro de los 30 minutos antes de la intervención.
<i>Y es alérgico a la penicilina:</i>	Clindamicina 600 mg intravenosos dentro de los 30 minutos antes del procedimiento.

En caso de exploraciones u operaciones abdominales, ginecológicas o urológicas, deberá seguir la prescripción de su médico tratante. Nosotros recomendamos como mínimo:

2 gramos de Ampicilina Intramuscular o intravenosa + **Gentamicina 1.5 mg/kg (no más de 120 mg)** dentro de los 30 minutos o al comenzar el procedimiento. **Recibirá una dosis extra 6 horas** después de Ampicilina 1 gramo intramuscular/intravenosa o Amoxicilina 1 gramo por boca (vía oral)

Si es alérgico a la penicilina:

Vancomicina 1 gramo intravenoso (a pasar lentamente en 1 hora) + **Gentamicina 1.5 mg/kg (no más de 120 mg)**, **completar las infusiones 30 minutos antes de iniciar el procedimiento.**

NOTA: Si toma anticoagulantes, las inyecciones intramusculares deben ponerse SIEMPRE en el tercio medio de la cara externa del muslo.

*Basadas en las recomendaciones sobre profilaxis de endocarditis del [ACC/AHA Practice Guidelines: Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease](#) (Guías para el manejo de los pacientes con enfermedad valvular de la asociación americana del corazón y del colegio americano de cardiología). ACC/AHA TASK FORCE REPORT. Bonow et al. JACC Vol 32 No.5. Noviembre 1, 1998; 1486-588.^

¥ En el 2008 se han publicado unas nuevas **Guías Sobre Prevención De Endocarditis en Enfermedad Valvular:** ACC/AHA 2008 Guideline Update on Valvular Heart Disease: Focused Update on Infective Endocarditis (J Am Coll Cardiol, 2008; 52:676-685, doi:10.1016/j.jacc.2008.05.008 (Published online 28 July 2008)), pero hasta que no exista mayor evidencia científica sobre la utilización de las mismas, nosotros continuamos recomendando las pautas aquí señaladas, a menos que exista contraindicación para ello.