

Dr. J. J. Rofilanchas Sánchez
Dr. J. M. Cortina Romero
Dr. E. Pérez de la Sota
Dr. A. Forteza Gil
Dra. M^a. J. López Gude
Dr. J. Centeno Rodríguez

INFORMACIÓN PARA PACIENTES

RECOMENDACIONES DE **ANTICOAGULACIÓN ORAL AL** **ALTA**

SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIACA

HOSPITAL “12 DE OCTUBRE”

RECOMENDACIONES DE **ANTICOAGULACION ORAL AL ALTA**^{i,ii,iii}

- **PACIENTES CON PRÓTESIS MECÁNICA MITRAL O MITRAL Y AORTICA:**
Sintrom según pauta de hematología para un INR de 2.5-3.5.

- **PACIENTES CON PRÓTESIS MECÁNICA AÓRTICA:**
Sintrom según pauta de hematología para un INR de 2.5-3.5 los tres primeros meses tras la cirugía posteriormente para un INR de 2-3.

- **PACIENTES CON PRÓTESIS BIOLÓGICA MITRAL O MITRAL Y AÓRTICA:**
Sintrom según pauta de hematología para un INR de 2.5-3.5 los tres primeros meses tras la cirugía posteriormente valorar AAS 80-100 mg al día o Sintrom para un INR de 2.5-3.5.

- **PACIENTES CON PRÓTESIS BIOLÓGICA AÓRTICA:**
Sintrom según pauta de hematología para un INR de 2.5-3.5 los tres primeros meses tras la cirugía posteriormente valorar AAS 80-100 mg al día o Sintrom para un INR de 2-3.

- **PACIENTES CON REPARACIÓN VALVULAR MITRAL:**
Sintrom según pauta de hematología para un INR de 2-3 los dos primeros meses tras la cirugía.

- **FA DE NUEVA APARICIÓN EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA:**
Revertida a ritmo sinusal: Mantener Sintrom para un INR de 2-3 durante 4 semanas.
No revertida: Mantener Sintrom para un INR de 2-3 durante 4 semanas. Valorar, pasado ese tiempo la cardioversión y mantener anticoagulación oral con un INR de 2-3 otras 4 semanas si revierte.

ⁱ Basadas en las recomendaciones sobre terapia antitrombótica del [ACC/AHA Practice Guidelines: Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease](#) (Guías para el manejo de los pacientes con enfermedad valvular de la asociación americana del corazón y del colegio americano de cardiología). ACC/AHA TASK FORCE REPORT. Bonow et al. JACC Vol 32 No.5. November 1, 1998; 1486-588.

RECOMENDACIONES DE ANTICOAGULACIÓN ORAL AL ALTA
SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIACA
HOSPITAL “12 DE OCTUBRE”

ⁱⁱ Basadas en las recomendaciones de la American Heart Association/American Collage of cardiology foundation guide to warfarin therapy. *Circulation*. 2003; 107: 1692-

ⁱⁱⁱ Basadas en las recomendaciones del American Collage of Chest Physicians guidelines. *Chest* 2001; 119: 3S-21S.